

Feuille d'exercices n°3 – Calcul matriciel

**1) Se repérer dans une matrice**

a) On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & -3 \\ 0 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 8 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

On note  $a_{i,j}$  (resp.  $b_{i,j}$ ,  $c_{i,j}$ ) le terme général de la matrice  $A$  (resp.  $B$ ,  $C$ ).

i. Quelles sont les tailles des trois matrices ?

ii. Donner les valeurs de  $a_{1,2}$ ,  $a_{2,1}$ ,  $b_{3,1}$ ,  $b_{1,3}$ ,  $c_{2,1}$ , et  $c_{1,2}$ .

iii. Remplacer les points des relations ci-dessous par les indices convenables (trouver toutes les bonnes réponses) :

$$b_{.,.} = 1, \quad a_{1,.} = 1, \quad c_{1,.} + c_{.,1} = 4$$

b) Écrire la matrice à 2 lignes et 3 colonnes définie par la formule :  $a_{i,j} = i^2 + j^2$ .

**2) Somme, produit par un réel**

a) Soit les matrices  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

i. Calculer :  $A + B$ ,  $2A - 3B$ ,  $3A - 2B$ , et enfin  $xA + yB$ , où  $x$  et  $y$  sont deux réels quelconques.

ii. Déterminer  $x$  et  $y$  pour que les deux termes de la première ligne de  $xA + yB$  valent respectivement 5 et 7.

b) Soit les matrices  $U = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$  et  $W = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -6 & -5 \end{pmatrix}$ .

Calculer la matrice  $M = 2U - 3V + W$ .

**3) Produit de matrices**

a) Soit les matrices  $M = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $v = (2 \quad -1 \quad 1)$ .

Calculer  $MB$ ,  $BM$ ,  $Mu$ ,  $uM$  et  $uv$ .

b) Calculer les produits matriciels suivants :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 7 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ne pas oublier de vérifier les calculs avec une calculatrice.

**4) Puissances de matrices**

a) Soit la matrice  $A = \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$ .

i. Calculer  $A^2$ , et montrer qu'il existe un réel  $\alpha$  tel que  $A^2 = \alpha A$ .

ii. En déduire la valeur de  $A^3$ ,  $A^4$ , et plus généralement  $A^n$ , pour  $n \in \mathbb{N}^*$ .

b) Soit  $B$  la matrice égale à  $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ .

i. Calculer  $A^2$  et  $A^3$ .

ii. En déduire la valeur de  $A^n$  en fonction de  $n \in \mathbb{N}^*$ .

c) Soit la matrice  $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ .

i. Calculer  $C^2$ ,  $C^3$  et  $C^4$ .

- ii. On admet l'existence, pour tout entier naturel non nul  $n$ , d'un réel  $a_n$  tel que  $C^n = a_n C$ . Trouver une expression de  $a_{n+1}$  en fonction de  $a_n$ , et en déduire la valeur de  $C^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

d) On considère les matrices

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}, \quad \Delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- i. Montrer que  $PP' = P'P = I$ , et que  $D = P\Delta P'$ .
- ii. Calculer  $\Delta^2$ ,  $\Delta^3$ , et vérifier que  $D^2 = P\Delta^2 P'$  et  $D^3 = P\Delta^3 P'$ .
- iii. On admet que  $\Delta^n$  s'écrit  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a_n \end{pmatrix}$ . Trouver une relation entre  $a_n$  et  $a_{n+1}$ , et en déduire la valeur de  $\Delta^n$  pour tout entier  $n$  non nul.
- iv. Montrer que  $D^n = P\Delta^n P'$  (en développant  $(P\Delta P')(P\Delta P')\dots(P\Delta P')$ , et en déduire la valeur de  $D^n$  en fonction de  $n$ .

### 5) Calcul matriciel en vrac

51) On donne les matrices  $A = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$  et  $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

- i. Calculer  $A^2$ , et trouver deux réels  $x$  et  $y$  tels que  $A^2 = xA + yI$ .
- ii. En déduire l'existence d'une matrice  $B$  telle que  $AB = I$ , et vérifier que  $BA = I$ .

52) Soit les matrices  $U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$  et  $V = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ .

- i. Calculer  $UV$ ,  $VU$ ,  $U^2$ ,  $V^2$  et enfin  $U^2 + 2UV + V^2$ .
- ii. Calculer  $W = U + V$ , puis  $W^2$ .
- iii. Pourquoi selon vous ces deux résultats sont-ils différents ?

### 6) Existe-t-il des matrices égales à leur carré ?

a) Que peut-on dire des dimensions d'une matrice  $A$  égale à son carré  $A \times A$  ?

b) Savez-vous répondre à la question posée pour des matrices carrées d'ordre 1 ?

c) Soit  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ .

Calculer  $M^2$ . Y a-t-il des valeurs de  $a$  et  $b$  pour lesquelles  $M^2 = M$  ?

d) Un brillant élève propose le raisonnement suivant à son professeur (où  $I$  est la matrice  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  et où  $O$  est la matrice nulle) :

$$M^2 = M \iff M^2 - M = O \iff M(M - I) = O \iff M = O \text{ ou } M = I$$

Le professeur lui fait remarquer qu'on a trouvé d'autres solutions que les deux solutions "évidentes"  $O$  et  $I$  ! Où l'élève s'est-il trompé ?

### 7) Application à l'économie

Une entreprise de confection de vêtements fabrique des jupes, des robes et des pantalons.

- Pour fabriquer une jupe, il faut 0,75m de tissu, 4 boutons et une fermeture Éclair.
- Pour fabriquer une robe, il faut 1,5m de tissu, 6 boutons et une fermeture Éclair.
- Pour fabriquer un pantalon, il faut 1,25m de tissu, 2 boutons et une fermeture Éclair.

On appelle  $x$ ,  $y$  et  $z$  les quantités respectives de jupes, de robes et de pantalons confectionnés, et  $a$ ,  $b$  et  $c$  les quantités de tissu (en mètres), de boutons et de fermeture Éclair utilisées pour la fabrication.

Enfin on considère les matrices :

$$M = \begin{pmatrix} 0,75 & 1,5 & 1,25 \\ 4 & 6 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

- a) i. Vérifier que  $B = MA$ .  
ii. Déterminer  $a$ ,  $b$  et  $c$  pour la fabrication de 200 jupes, 120 robes et 320 pantalons.

- b) On considère la matrice  $M' = \begin{pmatrix} -1,6 & 0,1 & 1,8 \\ 0,8 & 0,2 & -1,4 \\ 0,8 & -0,3 & 0,6 \end{pmatrix}$ .
- Calculer  $M'M$ .
  - Écrire la matrice  $A$  en fonction de  $B$  et de  $M'$ .
  - En déduire  $x$ ,  $y$  et  $z$  quand on utilise 735m de tissu, 2 400 boutons et 620 fermetures Éclair.
- c) L'entreprise a deux fournisseurs dont les prix de vente des différents produits sont donnés dans le tableau suivant :

	Prix du tissu (par m)	Prix d'un bouton	Prix d'une fermeture
Fournisseur 1	45	5	6
Fournisseur 2	48	4,5	5,5

On note  $C$  la matrice  $\begin{pmatrix} 45 & 5 & 6 \\ 48 & 4,5 & 5,5 \end{pmatrix}$ .

Calculer le produit  $CA$ . Que représente cette matrice ?